

Mit tudok a drogokról?

1. A drogoktól való fizikai (testi) függés okoz:

- A Erős fizikai és érzelmi vágyat, amely szükségessé teszi a dózis növelését
- B Erős fizikai és érzelmi vágyat, de nem szükséges a dózis növelése
- C Érzelmi vágyat, fizikai vágy nélkül, és nem szükséges az adag növelése
- D A rendszeres használatot, bármiféle vágy nélkül és nem szükséges az adag növelése

2. A drogoktól való lelki függés okoz:

- A Erős fizikai és érzelmi vágyat, amely szükségessé teszi a dózis növelését
- B Erős fizikai és érzelmi vágyat, de nem szükséges a dózis növelése
- C Érzelmi vágyat, fizikai vágy nélkül, és nem szükséges az adag növelése
- D A rendszeres használatot, bármiféle vágy nélkül és nem szükséges az adag növelése

3. A legveszélyesebb drogfüggőség orvosi szempontból:

- A Heroin
- B Alkohol
- C Altatószerek
- D Nikotin

4. Magyarországon ma a leginkább használt drogok:

- A Nikotin
- B Heroin
- C Alkohol
- D Nyugtatószerek

5. A drogfogyasztók leggyakoribb előfordulási helye:

- A Ifjúsági szervezetek
- B Középiskolák, egyetemek
- C Nagyvárosi szegénynegyedek
- D Bármiféle szervezetek

6. Melyik gyógyszer altató?

- A Kefalgin
- B Demalgon
- C Eunoctin
- D Algopyrin

7. Az altatók leggyakoribb orvosi használata:

- A Az alvás előidézése
- B A feszültség csökkentése
- C Fájdalomcsillapítás
- D Kutatómunka

- 8. Hogyan viselkedik az, aki több altatót vesz be, mint amennyit az orvos rendelt számára?**
- A Vihog, álmodozik
 - B Kiegyensúlyozatlan, visszahúzódó
 - C Álmos, szűkszavú
 - D Fáradékony
- 9. Melyek kábítószer?**
- A Seduxen, Elenium
 - B Kalmopyrin, demalgon
 - C Kefalgin, Phlogosol
 - D Kodein, Heroin, Morfin
- 10. Az alábbiak közül melyik szintetikus kábítószer?**
- A Methadone
 - B Opium
 - C Heroin
 - D Morfin
- 11. A kábítószer leggyakoribb orvosi használata:**
- A Érzéstelenítés
 - B Fájdalomcsillapítás
 - C Feszültség csökkentése
 - D Kutatómunka
- 12. Hogyan viselkedik az, aki orvosilag megengedett dózisonál több kábítószerrel szed?**
- A Izgatott és fokozottan aktív
 - B Rosszindulatú, agresszív
 - C Ideges és féltékeny
 - D Csendes, mindenfajta tevékenységben passzív
- 13. Mi történik, ha a gyermeket váró anya kábítószerrel él?**
- A A gyermek már drogfüggőségben szenved születésekor
 - B A gyermek fizikailag deformált állapotban születik meg
 - C A gyermek szellemileg fogyatékosan születik
 - D A gyermek már születésekor érzéktelen
- 14. Melyek nyugtatószerek?**
- A Phlogosol, maripen
 - B Seduxen, Andaxin
 - C Algopyrin, Kalmopirin
 - D Kodein, Heroin, Morfin
- 15. A nyugtatók leggyakoribb orvosi használata:**
- A Az alvás előidézése
 - B A feszültség csökkentése
 - C Fájdalomcsillapítás
 - D Növeli az éberségi szintet

16. A nyugtatók veszélyességi foka hazánkban (a drogfogyasztás szempontjából):

- A A legveszélyesebb
- B A második legveszélyesebb
- C A harmadik helyen van
- D Az ötödik helyen áll

17. A kábítószer mire hat leginkább?

- A A gondolatok összpontosítására
- B A képzeletre
- C Igazságérzetre
- D Indoklásra, motivációra

18. A Marihuána-élvezők legfeltűnőbb tünete:

- A Erős agresszivitás, hajlam az erőszakra
- B Piros szemek, az ambíció hiánya
- C Az összerendezett viselkedés teljes hiánya
- D Az önuralom teljes hiánya